

# Methodist Health System

## Colección de muestras de heces

- Los antiácidos, el bismuto de bario, los medicamentos antidiarreicos o los laxantes aceitosos no deben usarse antes de la recolección de la muestra de heces.
- Recoja la muestra en un recipiente de plástico seco de boca ancha o en una bolsa de plástico grande, que se coloca sobre la abertura del asiento del inodoro. **NO USE HECES QUE HAYAN SIDO INTRODUCIDAS EN EL INODORO O CUANDO ESTÉN MEZCLADAS (CONTAMINADAS) CON ORINA.**
- Seleccione una porción de heces y transfírela al recipiente apropiado. Se pueden llenar varios viales a partir de una muestra de heces.
- Los viales Parapak® Enteric Plus y Total Fix® son kits especiales que se utilizan para preservar y transportar muestras de heces. **Los líquidos contenidos en los kits son venenosos, por lo que es extremadamente importante manejar los envases con cuidado. No beba la solución y mantenga los kits fuera del alcance de los niños. Los viales tienen una línea de llenado designada. Agregue suficientes heces para llegar a la línea, pero no llene demasiado. Vuelva a tapar firmemente y agite vigorosamente para mezclar las heces con el líquido.**
- Etiquete todos los recipientes de heces con su nombre, fecha de nacimiento, fecha y hora de recolección de heces. Coloque los recipientes en una bolsa Ziploc.
- Parapak® (vial verde) y Total Fix® (vial negro) deben conservarse a temperatura ambiente. Refrigere todos los demás contenedores. Mantenga los paquetes fríos durante la entrega. Las muestras deben entregarse dentro de las 24 horas.
- Este formulario es solo para proporcionar instrucciones de recopilación. El médico debe proporcionar una orden escrita y firmada, que incluya: nombre del paciente, fecha de nacimiento, diagnóstico / síntomas y pruebas solicitadas.

Si tiene alguna pregunta sobre la prueba, llame al médico que ordenó la prueba o al Centro de Patología al (402) 354-4541 o al (888) 432-8980.

---

### Pruebas comunes de heces

- Panel de patógenos en heces (PCR) [el vial tiene una tapa verde]
- Heces de cultivo (pensadas como una prueba de curación solamente) [el vial tiene una tapa verde]
- C. Diff (Clostridium difficile Toxin reflex to PCR) [envase estéril]
- O & P Screen (Giardia Ag & Cryptosporidium Ag) [vial tiene tapa negra]
- Sangre oculta (RBC) [recipiente estéril]
- Detección de ARN de norovirus (virus de Norwalk) [contenedor estéril]
- Lactoferina fecal (WBC Fecal) [contenedor estéril]
- Helicobacter pylori Antígeno [contenedor estéril]

Revisado 11/2022 Nebraska Methodist Health System. Todos los derechos reservados. Todo el contenido proporcionado en este documento es solo para fines educativos, informativos y de orientación y no pretende servir como sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional individualizado. Nada de lo contenido en este documento establece o se utilizará para establecer la definición legal del "estándar de atención". El contenido debe usarse como guía y, dado que puede no aplicarse universalmente a todos los pacientes en todas las situaciones, los profesionales de la salud deben usar el contenido junto con un juicio independiente y caso por caso.