



3548 Meridian Street Suite 101, Bellingham, WA 98225

p: 360.527.4580 f: 360.527-4596 | www.averodx.com

3 horas glucosa prueba de tolerancia

Los pacientes OB son defendidos por su riesgo de desarrollar diabetes gestacional entre las semanas 26-28. Esta es una forma de diabetes que a veces se produce en el embarazo y usualmente se resuelve después del embarazo. Para asegurar resultados significativos, adecuada preparación de esta prueba es esencial. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones. Si usted tiene preguntas, por favor llame a nuestro laboratorio en (360) 527-4580.

1. Esta prueba requiere un total de 4 sorteos de la sangre y puede tardar hasta 4 horas para completar. Actividad puede interferir con los resultados va a necesitar permanecer en el laboratorio para la duración de la prueba.
2. El primer sorteo de sangre se hace ayuno (después de haber tenido nada que comer ni beber durante al menos 10-12 horas antes, excepto el agua).
3. Tras el primer sorteo de la sangre, se le dará un Urgent de 100 gramos.
4. Se tomaron muestras de sangre a exactamente 1, 2 y 3 horas después de haber terminado la bebida.
5. Se tomaron muestras de sangre en exactamente 1, 2 y 3 horas después de haber terminado la bebida
6. Asegúrese de no comer, beber, fumar o ejercicio para toda la duración de la prueba.

Nota: Si en cualquier momento usted vomita después de consumir la bebida, la prueba no es exacta. Nos pondremos en contacto con su proveedor y usted puede tener que repetir el proceso otro día.